

11.7. ZAURIETAN PROFILAXI ANTITETANIKOA EGITEKO JARRAIBIDEAK

Zaurietan profilaxi antitetanikoa egiteko jarraibideak^a

| TXERTOAREKIN LOTUTAKO AURREKARIAK | ZAURI GARBIA | | ZAURI TETANIGENOA ¹ | |
|-----------------------------------|---|------------------|---|------------------|
| | TXERTO(A)(Td) | IGT ^b | TXERTO(A)(Td) | IGT ^b |
| < 3 dosi edo zehazteke | BAI (txertoa osatu) | EZ | BAI (txertoa osatu) | BAI |
| 3 edo 4 dosi | EZ (Dosi bat eman, azken dositik 10 urte baino gehiago igaro badira) | EZ | EZ (Dosi bat eman, azken dositik 5 urte baino gehiago igaro badira) | EZ ² |
| 5 dosi edo gehiago | EZ | EZ | EZ (Azken dositik 10 urte baino gehiago igaro badira, dosi gehigarri bat eman edo ez balioetsi, zauriaren arabera) | EZ ² |

^a Immunodeprimituak eta bide parenteralez drogak hartzen dituzten pertsonak badira, immunoglobulina dosi bat emango da zauri tetanigenoetan, txerto-egoera edozein izanik ere.

^b IGT: immunoglobulina antitetanikoa. Txertoa emandako lekuaz aparteko leku batean emango da. Oro har, 250 UI emango dira. 24 ordu baino gehiago igaro badira, 90 kg baino gehiagoko pertsonak badira, eta kutsatzeko arrisku handia duten zauriak, erredurak, hausturak edo infektatutako zauriak agertzen badira, 500 UI-ko dosia emango da.

¹ Zauri tetanigenoak: desbitalizatutako ehun asko samar agertzen duten zauri edo erredurak, ziztada-zauria (bereziki lurzorua edo simaurra ukitu bada), gorputz arrotzez kutsatutako zauriak, zauri eta guzti duten hausturak, hozkadak, izozketak, kirurgia-ebakuntza behar dutenak (ebakuntza hori 6 ordu baino gehiagoz atzeratzen bada), eta septizemia sistematikoa duten pazienteek dituztenak.

² Kasu gutxi batzuetan, bereziki oso tetanigenoak diren zaurietan, esporak eduki ditzakeen material askoz kutsatutakoak edota desbitalizatutako ehun-alde handiak agertzen direnean, immunoglobulina dosi bat jasoko dute.