



ARABA/ÁLAVA

Este documento se ha elaborado con los datos del registro de cáncer del periodo 1986-2009 y los resultados de la publicación "Atlas municipal del cáncer de la CAPV, 2003-2008". Tiene como objetivo, mostrar la evolución del cáncer en la población del Territorio Histórico (TH) de Araba/Álava en las dos últimas décadas, así como destacar la información municipal.

La evolución de las tasas ajustadas por edad (con la población estándar europea) del TH se representa gráficamente junto con la de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV); se ha utilizado el modelo de regresión log lineal JoinPoint para su estimación. Junto a la evolución temporal, se expone el mapa de probabilidades, donde se representa la mayor o menor probabilidad de riesgo de los municipios de Araba/Álava en comparación al promedio de la CAPV. Finalmente, los diagramas de cajas muestran la distribución del riesgo en los tres TH con respecto al conjunto de la CAPV.

2



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

0

Epidemiologia Unitatea
Arabako Osasun Publikoaren eta
Adikzioen Zuzendariordetza

1

Unidad de Epidemiología
Subdirección de Salud Pública y Adic-
ciones de Álava

3

Resultados más destacados

- El **cáncer** en Araba/Álava sigue un patrón ascendente. En los hombres presenta un incremento significativo medio anual de 1,7% hasta 2004, después la tendencia se frenó con un descenso no significativo. En mujeres, el incremento significativo a lo largo del periodo es del 1,2% medio anual. El municipio de Vitoria-Gasteiz muestra un exceso de riesgo respecto la media de los municipios de la CAPV.
- El **cáncer de estómago**, que Araba/Álava parte de mayores tasas, desciende significativamente un 2,6% y 3,1% anual en hombres y en mujeres respectivamente (en CAPV decrece 2,8% y 2,9%). El exceso de riesgo por municipio se produce en Vitoria-Gasteiz.
- Aunque la tendencia del **cáncer colorrectal** en Araba/Álava es ascendente en hombres y mujeres, el incremento significativo anual en hombres (2,1%) es menor que en la CAPV. El aumento en mujeres de forma significativa es de 1,3% anual.
- La evolución del **cáncer de pulmón** en hombres es estable a lo largo de las dos décadas. Sin embargo en las mujeres presenta un aumento significativo anual de 4,8%, algo inferior al de la CAPV (6%).
- El cáncer de **mama femenino** aumenta de forma significativa una media de 0,9% anual.
- El **melanoma de piel**, representado sólo en hombres, muestra un incremento significativo de 5,1% y 4,6% anual en Álava y la CAPV respectivamente.
- El **cáncer de próstata** aumentó un 10,2% anual hasta 2003, posteriormente la tendencia se atenúa y baja. Por municipios, muestra un exceso de riesgo Vitoria-Gasteiz.
- La tendencia del **cáncer de tiroides en mujeres** es al alza, creciendo una media de 4,1% anual.

